

التهاب الملتحمة  
Conjunctivitis


## ”ما هي الملتحمة؟“

الملتحمة هي النسيج الشفاف الرقيق الذي يغطي الجزء الأبيض من العين ويحيط بالجزء الداخلي من الجفن، والتهاب الملتحمة (العين الوردية) هو التهاب وتورم ملتحمة العين والذي يحدث بسبب:

- العدوى البكتيرية والفiroسية.
- وجود جسم غريب في العين.
- الحساسية والتعرض للمواد الكيميائية الناتجة عن المهيجهات مثل تلوث الجو والكلور المستخدم في أحواض السباحة والتعرض للمواد الكيميائية الضارة.

## التهاب الملتحمة الفiroسي

- يزيد الالتهاب في مواسم معينة.
- يحدث بسبب مجموعة متنوعة من الفiroسات.
- قد تتعرض جميع الفئات العمرية للعدوى وتأثر بها.
- الالتهاب شديد العدوى وعادة يستمر لمدة ١٠ - ١٢ يوماً منذ بداية المرض.
- تحدث العدوى بصورة وبائية بين أفراد الأسرة والأماكن التي تكثر فيها التجمعات.
- يمكن أن يحدث مع وجود أعراض البرد والإفلونزا وغيرها من أنواع العدوى التنفسية.
- يببدأ الالتهاب عادة في إحدى العينين وتصاب العين الثانية بالعدوى خلال ٤٨ إلى ٧٢ ساعة.




## انتقال العدوى

- ينتقل الالتهاب عن طريق:
  - المصافحة.
  - العطس أو السعال.
  - أحواض السباحة العامة.
  - الأسطح والأدوات الملوثة مثل (مقبض الباب).
  - الأشياء التي لامستها إفرازات عين الشخص المصابة.
- مشاركة الآخرين في استخدام المناشف وأغطية المخدات وأدوات التجميل وغيرها.

## الأعراض

- تبدأ الأعراض في إحدى العينين وتصاب العين الأخرى خلال ٢٤-٤٨ ساعة. وقد تصبح الأعراض أسوأ خلال ٣-٥ أيام الأولى قبل أن تتحسن. ومن هذه الأعراض:
  - حساسية للضوء.
  - تورم الملتحمة.
  - عدم وضوح الرؤية.
  - إفرازات مائية أو مخاطية.
  - انتفاخ الجفن.
  - حكة في العين.
  - وجود لون أحمر أو وردي في العين.
  - شعور بحرقان.
  - الإحساس بجسم غريب في العين.



## العلاج

يقوم التهاب الملتتحمة الفيروسي باتخاذ مجرأه وعادة ما يزول خلال ١٤-٧ يوماً دون علاج ودون أي تبعات طويلة المدى، ولكن في بعض الحالات يستغرق التهاب الملتتحمة الفيروسي ٣-٢ أسابيع أو أكثر ليزول. والعلاج هو فقط داعم لعملية الشفاء فلا قطرات أو مراهم يمكن لها أن تعالج التهاب الملتتحمة الفيروسي.

### علاج الأعراض

الكمادات الباردة .

قطرات الترطيب ليشعر المريض بالراحة .

قد يقلل العلاج من الأعراض إلا أنه لا يقلل فترة العدوى .

يتم استخدام الكورتيزون في حالات التهاب الفيروسي الشديد أو في حال تأثر النظر .

قطرات العين المضادة للهيستامين / الاحتقان الموضعية قد تساعد في التخلص من

تهيج التهاب الملتتحمة الفيروسي وخاصة في حالة التهيج الشديد .



### إجراءات وقائية

تنظيف أي إفرازات متجمعة حول العين عدة مرات .

تعقيم الطاولات ومقابض الأبواب والكراسي ودورات المياه وغيرها .

على الأشخاص الذين يستخدمون العدسات اللاصقة إزالتها إلى أن تختفي الأعراض.

تجنب لمس أو دعك العين، حيث أن هذا قد يجعل الحالة أسوأ أو ينقل المرض للعين الثانية.

تجنب ملامسة الأطفال وكبار السن والأشخاص الذين يستخدمون الأدوية المتبطة للمناعة أو يتلقون العلاج الكيميائي والمرضى الذين يعانون من نقص المناعة.

عدم مشاركة الآخرين في استخدام المخدرات والمناشف وقطرات / مرادم العين ومكياج العين أو الوجه والعدسات اللاصقة وحافظاتها أو النظارات.



غسل الأيدي جيداً باماء الدافئ والصابون، خاصة قبل وبعد تنظيف العين ووضع قطرات ومرادم للعين المصابة.

قد يوصي الطبيب بعدم الذهاب للعمل أو المدرسة لعدة أيام أو لحين اختفاء الأعراض.

### ملاحظة

المحافظة على النظافة الجيدة هي أفضل طريقة للتحكم بعدم انتشار مرض التهاب الملتحمة.

مع تمنياتنا لكم بدوام الصحة والعافية

**التنقيف الصحي  
مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون**

---

ص.ب ٧١٩١ - ١١٤٦٢ الرياض

المملكة العربية السعودية

٩٢٠٠٠٥٨٣ تليفون

[www.kkesh.med.sa](http://www.kkesh.med.sa)



Health Education No. 50300-119

Revised February 2022