



الأدوية المستخدمة لعلاج الجلوكوما Glaucoma Medications

”الأدوية المستخدمة لعلاج الجلوكوما (ارتفاع ضغط العين)“

أدوية مضادات البيتا

- تايمولول.
 - ليفويونولول.
 - بيتاكسولول (يستخدم لمرضى الربو).
- الجرعة من مرة إلى مرتين باليوم.



قبل استخدام الدواء أخبر مقدم الرعاية الصحية :

إذا كنت تعاني من بطء في سرعة ضربات القلب أو عانيت من جلطة قلبية سابقاً.

إذا كنت تعاني من قصور في القلب (ضعف القلب).

إذا كنت مصاباً بمرض الربو أو أي مشكلة أخرى في التنفس مثل مرض الانسداد الرئوي المزمن (COPD).

إذا كنت ترضعين رضاعة طبيعية أو تخططين للإرضاع رضاعة طبيعية.

الآثار الجانبية

الجفاف.

الحرقان.

الوخز (الشعور بوجود جسم غريب في العين).

تهيج العين.

الصداع.

الدوار.

أدوية منبهات الألفا

بريمونيدين.

ابراكلونيدين.

الجرعة من مرة إلى ثلاث مرات باليوم.

قبل استخدام الدواء أخبر مقدم الرعاية الصحية :

إذا كنت تعاني من حساسية تجاه (البريمونيدين Brimonidine) أو (الكلونيدين Clonidine) أو (الابراكلونيدين Apraclonidine) أو أي مشتق آخر من مشتقات هذا العلاج.

إذا كنت تستخدم أدوية معينة لعلاج الاكتئاب كمجموعة مثبطات المونوامين او كسيداز مثل (ايزوكربوكسازيد Isocarboxazide) أو (ترانيلسيبرومين Tranilcybromen) أو العقاقير المستخدمة لعلاج مرض باركنسون مثل (سيليجيلين Selegelen) أو (رازاجيلين Razagelen).

إذا كنتِ ترضعين رضاعة طبيعية أو تخططين للإرضاع رضاعة طبيعية.



أدوية البروستاجلاندين

• اللاتانوبروست.

• البيماتوبروست.

• الترافيروست.

الجرعة مرة واحدة في اليوم قبل النوم

قبل استخدام الدواء أخبر مقدم الرعاية الصحية :

• إذا كنت تعاني من حساسية تجاه (اللاتانوبروست Latanoprost) (البيماتوبروست

• (Bimatoprost) .

• إذا كنت تعاني من عدوى الهربس في العين.



الآثار الجانبية

- تهيج العين.
- جفاف العين.
- الوخز (الشعور بوجود جسم غريب في العين).
- الحرقان.
- أعراض نزلات البرد الشائعة.

أدوية مثبتات إنزيم الكربونيك انهيدريريز

- دورزولاميد (القطرات من مرة إلى ثلاث مرات في اليوم).
- برينزولاميد (القطرات من مرة إلى ثلاث مرات في اليوم).
- أسيتازولاميد (الحبوب) وتستخدم (حبة إلى حبتين باليوم من مرتين إلى أربع مرات وبما لا يتجاوز ١٠٠٠ مغ يومياً).

قبل استخدام الدواء أخبر مقدم الرعاية الصحية :

- إذا كنت تعاني من حساسية تجاه كوريد النزاكونيوم (CLORIDEBENZALCOM) أو الدورزولاميد (DORZALAMIDE).
- إذا كنت تتناول الاسيتازولاميد (ACETAZOLAMIDE) لأنه يستخدم كمدر للبول، لذلك يجب تناول كمية كافية من الماء عند استخدام هذا الدواء.
- إذا كنت تعاني من أي مرض أو قصور في الكلى.
- إذا كنتِ ترضعين رضاعة طبيعية أو تخططين للإرضاع رضاعة طبيعية.

الآثار الجانبية

- الحرقان.
- الوخز (الشعور بجسم غريب في العين).
- تهيج العين.
- عدم وضوح الرؤية.
- مذاق سيء في الفم.
- جفاف العين.
- دموع كثيرة.
- الجفاف، بسبب إدرار البول (مع الحبوب) .



طرق حفظ وتخزين الدواء

- تخزين الدواء في درجة حرارة الغرفة.
- تخزين القطرات غير المفتوحة في الثلاجة وعدم تجميدها.
- يجب حفظ الأدوية بعيداً عن أشعة الشمس المباشرة وفي مكان بعيداً عن متناول الأطفال.

إرشادات عامة

- اتصل بطبيبك إذا لم تتحسن الأعراض أو ازدادت سوءاً.
- يمنع مشاركة الأدوية التي تتناولها مع أشخاص آخرين.
- يمنع كذلك استخدام أي أدوية من غير استشارة الطبيب المعالج.
- الاحتفاظ بقائمة الأدوية (الوصفات الطبية والمستحضرات الطبيعية و الفيتامينات والعقاقير المتاحة بدون وصفة طبية) الخاصة بك وإحضار هذه القائمة لطبيبك.
- يرجى استشارة الطبيب قبل البدء في استخدام أي علاج جديد، وذلك يتضمن الأدوية المتاحة بوصفة أو بدون وصفة طبية أو المستحضرات الطبيعية أو الفيتامينات.
- بعض الأدوية قد تحتوي على نشرة معلومات مريض مختلفة. إذا كانت لديك أية أسئلة عن هذا الدواء، يرجى استشارة الطبيب أو الصيدلي الخاص بك أو الممرض أو غيرهم من مقدمي الرعاية الصحية.

ماذا أفعل إذا فاتتني إحدى الجرعات؟

- حصل على جرعة بدلاً من الجرعة التي فاتتك فور تذكرك.
- إذا اقترب موعد الجرعة التالية، فاترك الجرعة الفائتة والتزم بالجرعات التالية.
- يمنع تناول جرعتين في نفس الوقت أو تناول جرعات إضافية.

استخدام معلومات المراجع وإخلاء المسؤولية

لا ينبغي استخدام هذه المعلومات بغرض تحديد تناول هذا الدواء أو أي دواء آخر من عدمه، فمقدم الرعاية الصحية هو وحده من لديه المعرفة والتدريب مما يتيح له تحديد أي الأدوية تناسب المريض بعينه.

هذه المعلومات لا تجيز أي دواء باعتباره آمناً أو فعالاً أو معتمداً لعلاج أي مريض أو أي حالة صحية.

هذا ليس إلا ملخصاً موجزاً للمعلومات عن هذا الدواء فحسب وهو لا يشمل مطلقاً كل المعلومات المتعلقة بالاستخدامات أو الإرشادات أو التحذيرات أو الاحتياطات أو التفاعلات أو الآثار الضارة أو المخاطر المحتملة التي قد تنطبق على هذا الدواء.

هذه المعلومات ليست نصيحة طبية محددة ولا تحل محل المعلومات التي تحصل عليها من مقدم الرعاية الصحية الذي تتبعه.

يجب أن تستشير مقدم الرعاية الصحية الذي تتبعه بخصوص المعلومات الكاملة عن مخاطر استخدام هذا الدواء وفوائده.

مع تمنياتنا لكم بدوام الصحة والعافية

التوعية الصحية
مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون

ص.ب ٧١٩١ - الرياض ١١٤٦٢
المملكة العربية السعودية
تليفون ٩٢٠٠٠٠٥٨٣
www.kkesh.med.sa

